

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-1-77372763

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION de la STATION "AQUITAINE"

GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&GARONNE, LANDES, PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Chemin d'Artigues, 33150 CENON - Tél. 86.22.75 - 86.24.35

ABONNEMENT ANNUEL

50,00 Francs

Sous-Régisseur d'Avances et de Recettes,
Direction Départementale de l'Agriculture

C. C. P. I BORDEAUX 6702-46 X

24 JANVIER 1977 - BULLETIN TECHNIQUE N° 83

CLOQUE DU PECHER

Un début de débourrement chez quelques variétés de pêchers et de nectarines (Springcrest, Mayred, Silver Lode, etc...) est observé, dans les Pyrénées Atlantiques notamment.

Si le temps doux se maintient, surveiller attentivement les variétés sensibles à débourrement précoce, particulièrement celles situées en expositions privilégiées. Nous rappelons que les contaminations essentielles ont lieu à l'occasion des pluies qui se produisent au moment où les bourgeons commencent à s'ouvrir pour laisser apparaître la pointe de la première feuille (stade B).

Dès l'apparition de ce stade sensible, sur les bourgeons à bois les plus avancés, situés généralement aux extrémités des prolongements, procéder sans retard à l'application d'un traitement préventif.

Dans les vergers constitués de variétés à floraison échelonnée, il est préférable d'intervenir séparément sur chaque variété dès qu'un mouvement de sève sera observé.

Pour sa bonne rémanence et son action marquée sur divers champignons et bactéries, il est préférable d'utiliser un produit cuprique à la dose de 500 g de cuivre métal par hectolitre d'eau.

Dans les vergers taillés depuis moins d'une dizaine de jours au moment du traitement, utiliser l'un des produits suivants :

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - captafol (Difosan, Orthodifolatan) | 120 g M.A./hl |
| - captane (nombreuses spécialités) | 250 g M.A./hl |
| - ferbame (Ferbamate - Sépifer) | 175 g M.A./hl |
| - thirame (nombreuses spécialités) | 175 g M.A./hl |
| - zirame (nombreuses spécialités) | 175 g M.A./hl |

Soigner l'application en veillant à bien mouiller toute la frondaison des arbres, y compris les extrémités.

Si le traitement est effectué dans de bonnes conditions avec un débournement régulier et ne se prolongeant pas anormalement, il n'y aura pas lieu de renouveler cette application.

.../...

P188

COCHENILLE ROUGE DU POIRIER SUR PRUNIER

Dans les vergers de pruniers infestés par la cochenille rouge du poirier (*Epidiaspis leperii*), un traitement est recommandé avant le débourrement.

Utiliser une huile jaune à la dose de 2 litres de spécialité commerciale par hectolitre d'eau en lessivant les arbres jusqu'à ruissellement.

Ne traiter que les vergers fortement infestés, en ne dépassant pas le stade B, gonflement des bourgeons et en dehors des périodes de gel.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire
"AQUITAINE"

M. LARGE


Imprimerie de la Station de BORDEAUX
Directeur-Gérant : P. JOURNET
Inscription à la C.P.P.P. n° 524 AD

Stades repères du prunier

Dessins de M. BAGGIOLINI




A




B



C




D



E

On voit les étamines



F

Fleur ouverte



G

Chute des pétales




H

Nouaison



I

Le calice tombe



J

Jeune fruit

Stades repères du pêcher

Dessins de M. BAGGIOLINI



A

Bourgeon d'hiver



B

Bourgeon gonflé



C

On voit le calice




D

On voit la corolle




E

On voit les étamines



F

Fleur ouverte



G

Chute des pétales



H

Fruit noué



I

Jeune fruit

P189